

## ナベルビン療法(2投1休)

患者番号: \_\_\_\_\_ 氏名: \_\_\_\_\_  
対象患者 ; ( 乳癌再発 3<sup>rd</sup> line 化学療法 非小細胞肺癌 )  
薬剤注入ルート ; ( 末梢点滴静注 CVライン ポート )  
開始年月日 ; 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
投与間隔 ; 3週1コース  
体格 ; 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
減量・中止基準 ; 投与前の白血球数が2000未満であった場合には投与を延期


使用薬剤;

- ① ナベルビン \_\_\_\_\_ mg ( 25mg/m<sup>2</sup> ) day 1, 8  
点滴静脈注射  
2週投与1週休薬

**制吐剤** グラニセトロン点滴静注用 3mg 100mL

**【処方が必要な内服薬】**

貧血、好中球低下に注意



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_