

mFOLFOX 6 療法

(オキサリプラチン+レボホリナート+5-FU) インフューザー

患者番号： _____ 氏名： _____ 性別： _____

生年月日： _____ 年齢： _____

対象： 転移性結腸・直腸癌で、PS： 0～2、5-FU もしくはエルプラットの既往治療がない症例
薬液注入ルート； (ポート 末梢点滴静注 CVライン)

開始年月日； _____ 年 _____ 月 _____ 日

投与間隔； 2週を1クール

体格； 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²


使用薬剤；

- ① オキサリプラチン _____ mg (85mg/m²) (2時間点滴静注) day1
- ② レボホリナート _____ mg (200mg/m²) (2時間点滴静注) day1,
- ③ 5-FU _____ mg (400mg/m²) (15分間で静脈内急速投与) day1
- ④ 5-FU _____ mg (2400mg/m²) (46時間点滴静注) day1

オキサリプラチンは6コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注16.5mg、ファモチジン注20mg、ベナ錠50mgで効果があったという報告があります

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____