

## ゲムシタビン療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
部位； ( 膵癌 胆管癌 胆嚢癌、肺癌 )  
薬液注入ルート； ( 末梢点滴静注 CVライン ポート )  
開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
投与間隔； 28日間で1サイクル  
体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>


使用薬剤；

①ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg (1000mg/m<sup>2</sup>) 3週投与1週休薬  
30分間で投与

制吐薬 デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

骨髄抑制、アレルギー、心不全、間質性肺炎、腎機能に注意



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_