

イホマイド療法指示書

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

クール 回目

第1日目 月 日

- 1) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (60分)
- 2) ルート ; グラニセトロン(3mg) 100ml+デキサート 6.6mg (①と同時に開始)
- 3) DIV ; 生食 500ml+イホマイド mg (4時間)
- 4) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 5) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 6) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 7) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 8) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 9) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 10) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 11) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (3時間)

指示医師サイン

看護師指示受けサイン

実施看護師サイン

医師実施確認

第2日目 月 日

- 1) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (60分)
- 2) ルート ; グラニセトロン(3mg) 100ml+デキサート 6.6mg (①と同時に開始)
- 3) DIV ; 生食 500ml+イホマイド mg (4時間)
- 4) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 5) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 6) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 7) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 8) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) mg+生食 20ml
- 9) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 10) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 11) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (3時間)

指示医師サイン

看護師指示受けサイン

実施看護師サイン

医師実施確認

第3日目 _____ 月 _____ 日

- 1) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (60分)
- 2) ルート ; グラニセトロン(3mg) 100ml+デキサート 6.6mg (①と同時に開始)
- 3) DIV ; 生食 500ml+イホマイド _____ mg (4時間)
- 4) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 5) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 6) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 7) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 8) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 9) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 10) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 11) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (3時間)

指示医師サイン _____

看護師指示受けサイン _____

実施看護師サイン _____

医師実施確認 _____

第4日目 _____ 月 _____ 日

- 1) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (60分)
- 2) ルート ; グラニセトロン(3mg) 100ml+デキサート 6.6mg (①と同時に開始)
- 3) DIV ; 生食 500ml+イホマイド _____ mg (4時間)
- 4) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 5) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 6) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 7) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 8) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 9) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 10) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 11) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (3時間)

指示医師サイン _____

看護師指示受けサイン _____

実施看護師サイン _____

医師実施確認 _____

第5日目 _____ 月 _____ 日

- 1) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (60分)
- 2) ルート ; グラニセトロン(3mg) 100ml+デキサート 6.6mg (①と同時に開始)
- 3) DIV ; 生食 500ml+イホマイド _____ mg (4時間)
- 4) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 5) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 6) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 7) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 8) ルート ; メスナ (ウロミテキサン) _____ mg+生食 20ml
- 9) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 10) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (4時間)
- 11) DIV ; リプラス1号 500ml+炭酸水素ナトリウム注射液 20ml (3時間)

指示医師サイン _____

看護師指示受けサイン _____

実施看護師サイン _____

医師実施確認 _____