

タグリッソ療法

患者番号： 氏名： 性別：
生年月日： 年齢：

対象：	EGFR 遺伝子変異陽性患者の一次治療 あるいは他の EGFR-TKI にて病勢進行が認められ T790M 変異陽性が確認された非小細胞肺癌患者
投薬ルート：	内服
開始年月日：	年 月 日
体格：	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²

使用薬剤：

① タグリッソ 1回 80 mg
1日1回 朝食後

減量方法；40mg へ減量する

- ※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、初期症状の確認及び胸部X線検査の実施など観察を行う
- ※ 患者の状態に応じて定期的に肝機能検査を実施する
- ※ 下痢、ざそう、発疹、爪の障害
- ※ リファンピシン、ロスバスタチン等の相互作用には注意が必要

【処方が必要な内服薬】

ヘパリン類似物質油性クリーム（全身に使用）
アンテベート軟膏（体の湿疹に使用）
ロコイド軟膏（顔の湿疹に使用）
リンデロンVGローション（頭の湿疹に使用）

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
HBs 抗体(+), and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____