

ノギテカン療法

患者番号：

氏名：

対象	小細胞肺癌
薬液注入ルート	末梢点滴静注、 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
1コース期間	3～4週間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²
中止基準	白血球数 4000/ μ l未満 血小板 10万/ μ l未満


	抗がん剤名	投与量	投与日程
1	ハイカムチン	mg (1.0mg/m ²)	5日間投与して最低16日は休薬

※腎障害 (CCr20-39mL/min) のある患者では0.5 mg/m²で開始

増減量の段階	投与量	投与後の最低値が白血球 2000 以上及び血小板 5 万以上の場合には増量できる。 白血球 1000 未満又は血小板 3 万未満となった場合には減量する。
1段階増量	1.2 mg/m ² /日	
初回投与量	1.0 mg/m ² /日	
1段階減量	0.8 mg/m ² /日	

制吐剤 グラニセトロン点滴静注用 3mg+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBe 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBe 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____