

### アバスチン+S-1療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
 対象： 転移性結腸・直腸癌で、PS： 0～2  
 薬液注入ルート； ( ポート 末梢点滴静注 CVライン 内服 )  
 開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
 投与間隔； 6週1クール  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；  
 注射 ①アバスチン \_\_\_\_\_ mg (5mg/kg) 2週に1回  
 内服 ①エスワンタイホウ 1回 \_\_\_\_\_ mg 1日2回 4週投与2週休薬


体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

制吐薬なし

【処方が必要な内服薬】

エスワンタイホウ ( ) 錠 ×朝夕食後



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_