

S-1(4投2休)療法

患者番号： _____ 氏名： _____
部位； (胃、結腸、直腸、乳腺、非小肺、胆、膵)
ルート； (内服)
開始年月日； _____年 _____月 _____日
投与間隔； 4週投与2週休薬 で1クール
体格； 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

使用薬剤；
エスワнтаイホウ _____ mg/day 4週間投与 2週休薬


体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ () 錠 ×朝夕食後

骨髄抑制、肝障害、消化器症状、下痢に注意



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), or HBs 抗体(+), HBc 抗体(+), and HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____