

## アービタックス+イリノテカン療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_ 性別： \_\_\_\_\_  
 生年月日： \_\_\_\_\_ 年齢： \_\_\_\_\_  
 対象； RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌  
 薬液注入ルート； 末梢点滴静注 CVライン ポート  
 開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
 投与間隔； 6週間で1クール  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；①アービタックス \_\_\_\_\_ mg (初回 400mg/m<sup>2</sup>) 2時間  
 \_\_\_\_\_ mg (2回目以降 250mg/m<sup>2</sup>) 1時間  
 毎週投与  
 ②イリノテカン \_\_\_\_\_ mg ( 100 mg/m<sup>2</sup> )  
 4週投与2週休薬

遺伝子多型；


※複合ヘテロ及び  
ホモでは減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

制吐薬 グラニセトロンゼリー+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠 (10) 5錠 アービタックス 30分前  
 グラニセトロンゼリー 1包 アービタックス 30分前  
 ミノサイクリン (100) 2C2×朝夕食後  
 ヘパリン類似物質油性クリーム 全身 アンテベート軟膏 体 ロコイド軟膏 顔  
 ウルティオキシコール酸錠 100mg 3錠 3×毎食後  
 マグミット 330mg 6錠 3×毎食後  
 重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_