

## CP 療法

### シスプラチン+イリノテカン

患者番号：                      氏名：  
 部位；                      (胃)  
 薬液注入ルート；( 末梢点滴静注、 CVライン      ポート )  
 開始年月日；              年      月      日  
 投与間隔；                      14日間で1クール  
 体格；      身長      cm      体重      kg      体表面積      m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；①イリノテカン      mg ( 60 mg/m<sup>2</sup> )      day 1, 15  
                   ②シスプラチン      mg ( 30 mg/m<sup>2</sup> )      day 1, 15

#### 遺伝子多型；


※複合ヘテロ及びホモ  
では減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

**制吐剤**    グラニセトロン静注用 3mg+デキサート注 9.9mg  
                   イメンド 125mg(day1)、イメンド 80mg(day2-3)

#### 【処方が必要な内服薬】

イメンド (125) 1C    グラニセトロン開始 30分前  
 イメンド (80) 1C1×朝食後    2日分 (翌日開始)  
 ウルソデオキシコール酸    3錠 3× 3日分  
 マグミット (330)    6錠 3×毎食後 3日分  
 重曹錠 500mg    3錠 3×毎食後 2時間 3日分



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) →  HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_