

ジカディア療法

患者番号： 氏名： 性別：
生年月日： 年齢：

対象：	ALK 融合遺伝子陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
投薬ルート：	内服
開始年月日：	年 月 日
体格：	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²

使用薬剤：

① ジカディアカプセル 1回 750 mg 1日1回 空腹時
(食前1時間及び食後2時間を避ける)

- ※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、臨床症状の確認及び胸部 CT 検査等を行う
- ※ 肝機能障害があらわれることがあるため、定期的に肝機能検査を行う
- ※ QT 延長、徐脈になる事があるため定期的に心電図及び電解質 (Mg K Ca) 検査を行う
- ※ 高血糖、糖尿病が現れる事があるので定期的に血糖測定を行う
- ※ 膵炎、リパーゼ増加、アミラーゼ増加が現れる事があるので定期的に検査を行う

【処方が必要な内服薬】

ジカディアカプセル (150) 5C1×

HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____