

### ベクティビックス単剤療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_

対象：RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

PS：0～2 間質性肺炎、肺線維症の合併がない症例

薬液注入ルート；( ポート 末梢点滴静注 CVライン )

開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

投与間隔； 2週を1クール

体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>


使用薬剤；

① ベクティビックス \_\_\_\_\_ mg (6mg/kg) (1時間点滴静注) day1

制吐薬なし

【処方が必要な内服薬】

ミノサイクリン (100) 2C2×朝夕食後  
ヘパリン類似物質油性クリーム 全身  
アンテベート軟膏 体  
ロコイド軟膏 顔



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_