

## ゲムシタビン+S-1 (2投1休) 療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
 部位； ( 膵癌 胆管癌 胆嚢癌 )  
 薬液注入ルート； ( ポート 末梢点滴静注 CVライン 内服 )  
 開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 投与間隔； ゲムシタビン 2週投与1週休薬  
                   S-1 2週投与1週休薬  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

使用薬剤；

① エスワソライホウ \_\_\_\_\_ mg/回 1日2回朝夕食後

※腎機能を考慮して  
初回基準量を調節

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg/回


② ゲムシタビン \_\_\_\_\_ mg (1000mg/m<sup>2</sup>) 2週投与1週休薬  
30分間で投与

制吐薬 デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

エスワソライホウ ( ) 錠 ×朝夕食後

骨髄抑制、アレルギー、心不全、間質性肺炎、腎機能に注意



□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

□HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)

□HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_