

## 乳癌 IRIS 療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
 部位； (乳)  
 薬液注入ルート；(末梢点滴静注 CVライン ポート 内服)  
 開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
 投与間隔； ①イリノテカン 2週投与 1週休薬  
 ② S-1 月・水・金・日  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；

① S-1 \_\_\_\_\_ mg/day (月・水・金・日)

※腎機能を考慮して  
初回基準量を調節

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

② イリノテカン \_\_\_\_\_ mg ( 80 mg/m<sup>2</sup> ) day 1, 8

遺伝子多型；


※複合ヘテロ及びホモでは減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 3.3 mg

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg 6錠 3×毎食後 /3日間  
 ウルソ® 胆汁酸錠 100mg 3錠 3×毎食後 /3日間  
 重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間 /3日間



□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介  
 □HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量  
 □HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) → □HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_