光晴会病院化学療法委員会
2018 年 10 月 20 日改訂

タイケルブ＋ゼローダ療法

患者番号：　　氏名：
部位；　（　乳腺　）
内服
開始年月日；　年　月　日
投与間隔；タイケルブ　連日投与
ゼローダ　２週投与　１週休薬　で１クール
体格；　身長＿＿＿＿ｃｍ　体重＿＿＿ｋｇ　体表面積＿＿＿＿m^2

使用薬剤；
① タイケルブ（250mg）：　1250 mg（５Ｔ）　１日１回　連日投与
食事の前後１時間以内を避ける

② ゼローダ　（300mg）：　ｍｇ（１回用量　1000 ｍｇ/m^2）
１日２回、２週投与　１週休薬

【処方が必要な内服薬】

タイケルブ（250）5 錠 1×食事の前後 1 時間を避ける
ゼローダ（300）　錠　×朝夕食後
ピドキサール（10）6 錠 3×毎食後
パスタロンクリーム 10%　1 日 5 回以上塗布

手足症候群、骨髄抑制、消化器症状、下痢、口内炎、全身疲労感に注意



☐HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
☐HBs 抗原(－) → ☐HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)　☐HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
☐HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋)　☐HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿