

## 外来型 FOLFIRI 療法

(イリノテカン+レボホリナート+イリノテカン+5-FU) インフューザー

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_ 性別： \_\_\_\_\_  
 生年月日： \_\_\_\_\_ 年齢： \_\_\_\_\_  
 対象： 転移性結腸・直腸癌で、PS： 0～2、5-FU もしくはイリノテカンの前治療がない症例  
 薬液注入ルート； ( ポート 末梢点滴静注 CVライン )  
 開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 投与間隔； 2週を1クール  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；

- ① イリノテカン \_\_\_\_\_ mg (150mg/m<sup>2</sup>) (2時間点滴静注) day1
- ② レボホリナート \_\_\_\_\_ mg (200mg/m<sup>2</sup>) (2時間点滴静注) day1,
- ③ 5-FU \_\_\_\_\_ mg (400mg/m<sup>2</sup>) (15分間で静脈内急速投与) day1
- ④ 5-FU \_\_\_\_\_ mg (2400mg/m<sup>2</sup>) (46時間点滴静注) day1

遺伝子多型；


※複合ヘテロ及びホモ  
では減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg 6錠 3×毎食後 /3日間  
 カルデ オキシコール酸錠 100mg 3錠 3×毎食後 /3日間  
 重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間 /3日間



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_