光晴会病院化学療法委員会
2018 年 10 月 26 日改訂

カルボプラチン＋ナベルビン療法

患者番号：　　氏名：　　性別：
生年月日：　　年齢：

がん種：	非小細胞肺癌
薬液注入ルート：	末梢点滴静注、　CV ライン　　ポート
開始年月日：	年　　月　　日
1 コース期間：	3 週間
体格：	身長　ｃｍ　　体重　ｋｇ　　体表面積　m^2
減量・中止基準：	白血球数 2,000/mm^3 未満

	抗がん剤名	投与量	投与開始日程		
			1 日目	8 日目	15 日目
1	カルボプラチン	mg(AUC=5)	●	×	×
2	ナベルビン	mg(25mg/m^2)	●	●	×

制吐剤　アロキシ静注用 0.75mg+デキサート注 6.6mg
イメンド 125mg(day1)、イメンド 80mg(day2-3)

【処方が必要な内服薬】

イメンド 125mg　1 回 1 錠　1 日 1 回アロキシ投与 30 分前　/　1 日分　(day1)
イメンド 80mg　1 回 1 錠 1 日 1 回朝食後　/　2 日分　(day2-3)



□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(−) → □HBs 抗体(−)and HBc 抗体(−) → □HBV-DNA 定量(−) → 3 ヵ月毎 定量
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン