

## UFT+ユーゼル療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&  
部位； ( 大腸 )  
薬剤投与ルート；( 内服 )  
開始年月日； 年 月 日  
投与間隔； 5週間で1クール  
体格； 身長 \_\_\_\_\_ c m 体重 \_\_\_\_\_ k g 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>


使用薬剤；

①UFT \_\_\_\_\_ m g ( 300m g / m<sup>2</sup>を目安 ) (8時間毎 1日3回に分けて)

②ユーゼル \_\_\_\_\_ 75 m g / day (8時間毎 1日3回に分けて)

4週投与(連日) 1週休薬

食事の前後1時間を避けて投与(薬剤血中濃度が食事の影響を受けるため)  
骨髄抑制、消化器症状、アレルギー、関節痛、筋肉痛、色素沈着に注意



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_