

## ゲムシタビン療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&  
部位； ( 膵癌 胆管癌 胆嚢癌、肺癌 悪性胸膜中皮腫)  
薬液注入ルート；( 末梢点滴静注 CVライン ポート )  
開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
投与間隔； 28日間で1サイクル  
体格； 身長\_\_\_\_\_cm 体重\_\_\_\_\_kg 体表面積\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>


使用薬剤；

- ① ゲムシタビン \_\_\_\_\_mg (1000mg/m<sup>2</sup>) 3週投与1週休薬  
30分間で投与

**制吐剤** デキサート注 6.6mg

骨髄抑制、アレルギー、心不全、間質性肺炎、腎機能に注意

### 【処方が必要な内服薬】



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_