

EC療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&
生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&
部位； (乳癌)
薬液注入ルート；(末梢点滴静注 CVライン ポート)
開始年月日； 年 月 日
投与間隔； 2 1日間隔で1クール
体格； 身長 _____ c m 体重 _____ k g 体表面積 _____ m²

使用薬剤；

① エピルビシン 静注 _____ mg (100 mg/m²) day1

60 mg/m ²	高齢者
75 mg/m ²	減量対象
100 mg/m ²	標準

② エンドキサン 点滴静注 _____ mg (600 mg/m²) day1

制吐薬アロキシ注+デキサート注 9.9mg


アプレピタント内服 (3日間) +デカドロン内服 8mg 2日間

【処方が必要な内服薬】

アプレピタント (125) 1C アロキシ開始 30分前
アプレピタント (80) 1C1×朝食後 2日分 (翌日開始)
デカドロン錠 (4) 2錠 2×朝昼食後 2日分 (翌日開始)

外来でジーラスタ注 3.6mg 投与を推奨しますが、患者負担が約 3万5千円かかることを説明したうえで決める (疼痛時セレコックス 100mg など使用)

脱毛、骨髄抑制、消化器症状、心症状に 特に注意



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____