

**アリムタ+カルボプラチン+Bev 療法**

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

がん種	切除不能な進行・再発非小細胞肺癌における非扁平上皮癌
適応患者	PS 0～1
薬液注入ルート	末梢点滴静注、 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
1 コース期間	21 日間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m <sup>2</sup>
減量・中止基準	


投与方法	薬剤名	投与量	投与日程	
点滴	①アリムタ	mg (500mg/m <sup>2</sup> )	1 週投与 2 週休薬	Day1
点滴	②カルボプラチン	mg (AUC5)	1 週投与 2 週休薬	Day1
点滴	③ベバシズマブ	mg (15mg/kg)	1 週投与 2 週休薬	Day1

**4 コース後に PD までアリムタ+ベバシズマブを継続する**

**制吐剤** グラニセトロン点滴静注用 3mg+デキサート注 6.6mg

**【処方が必要な内服薬】**

パンピタン末 1g1× 初回投与1週間以上前から連日経口開始  
 デカドロン(4) 2T2× (アリムタの前後1日)  
 <注射>  
 メコバラミン注 500 2A  
 (初回投与1週間前から9週ごとに筋肉内投与前日及び翌日)



HBs 抗原(+) → **消化器内科紹介**

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

**指示医師サイン** \_\_\_\_\_