

GC療法

ゲムシタビン+シスプラチン

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&
生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

対象： 進行性尿路上皮癌

薬液注入ルート： 末梢点滴静注、 CVライン ポート

開始年月日： 年 月 日

1コース期間： 28日間

体格： 身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

使用薬剤；


	抗がん剤名	投与量	投与開始日程			
			1日目	2日目	8日目	15日目
1	ゲムシタビン	mg (1000mg/m ²)	●		●	●
2	シスプラチン	mg (70mg/m ²)		●		

制吐薬 アロキシ注+デキサート注 9.9mg

アプレピタント内服 (3日間) +デカドロン内服 8mg 3日間

【処方が必要な内服薬】

アプレピタント (125) 1C シスプラチン開始1時間前
アプレピタント (80) 1C1×朝食後 2日分 (翌日開始)
デカドロン錠 (4) 2錠2×朝食後 3日分 (翌日開始)



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____