

XC療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&
生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&
部位； (乳腺)
薬剤投与経路； (内服)
開始年月日； 年 月 日
投与間隔； 21日間隔で1クール
体格； 身長 _____ c m 体重 _____ k g 体表面積 _____ m²
使用薬剤；

① カペシタビン _____ m g (下表より/回) 1日2回 2週投与1週休薬

体表面積	初回投与量
1.31 m ² 未満	900mg (3錠) /回
1.31 m ² 以上～1.64 m ² 未満	1200mg (4錠) /回
1.64 m ² 以上	1500mg (5錠) /回

② エンドキサン _____ 50 m g (32.5mg/m²/回 ただし、エンドキサン 1T=50mg)
1日2回 2週投与1週休薬


③ ピドキサール 60m g 3×毎食後内服

④ 尿素クリーム 1日5回以上塗布

【処方が必要な内服薬】

カペシタビン (300) 錠 ×朝夕食後
エンドキサン (50) 2錠 2×朝夕食後
ピドキサール (20) 3錠 3×毎食後
尿素クリーム 10%

手足症候群、骨髄抑制、消化器症状、下痢に注意



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____