

## XP 療法

### カペシタビン+シスプラチン

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&

生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

対象： 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

薬液注入ルート： 末梢点滴静注、 CVライン ポート

開始年月日： 年 月 日

1コース期間： 21日間

目標コース数 コース

体格： 身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup>

使用薬剤；注射 ①シスプラチン \_\_\_\_\_ mg (80mg/m<sup>2</sup>) 120分 3週に1回 day1

内服 ①カペシタビン \_\_\_\_\_ mg

(C法にて投与量決定)

点滴翌日より2週投与1週休薬

体表面積	1回用量
1.36 m <sup>2</sup> 未満	1200mg
1.36 m <sup>2</sup> 以上 1.66 m <sup>2</sup> 未満	1500mg
1.66 m <sup>2</sup> 以上 1.96 m <sup>2</sup> 未満	1800mg
1.96 m <sup>2</sup> 以上	2100mg


**制吐剤** パロノセトロン注 0.75mg+デキササート注 9.9mg+アロカリス注 235mg

デカドロン錠 8mg 2日間

#### 【処方が必要な内服薬】

デカドロン (4) 2錠 2×朝昼食後 2日間 (翌日開始)

カペシタビン



□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

□HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)

□HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_