

Bev+カペシタビン療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

対象：転移性結腸・直腸癌で、PS：0～2

薬液注入ルート；（ポート 末梢点滴静注 CVライン 内服）

開始年月日； 年 月 日

投与間隔； 3週1クール

体格； 身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

使用薬剤；

注射 ①ベバシズマブ mg (7.5mg/kg) 3週に1回

内服 ①カペシタビン mg (C法：1000mg/m²/回)

1日2回、2週投与1週休薬

手足症候群、末梢神経障害、骨髄抑制、消化器症状、下痢に注意

体表面積	初回投与量
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)/回
1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)/回
1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)/回
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)/回


制吐薬なし

【処方が必要な内服薬】

カペシタビン（300）錠 ×朝夕食後

ピドキサール（10）6錠 3×毎食後

尿素クリーム10% 1日5回以上



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____