

## ddEC 療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&

生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

部位； ( 乳癌 )

薬液注入ルート；( 末梢点滴静注 CVライン ポート)

開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

投与間隔； 14日間隔で1クール

体格； 身長 \_\_\_\_\_ c m 体重 \_\_\_\_\_ k g 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

使用薬剤；


- ① エピルビシン 静注 \_\_\_\_\_mg ( 90 mg/m<sup>2</sup> ) day1
- ② エンドキサン 静注 \_\_\_\_\_mg ( 600 mg/m<sup>2</sup> ) day1
- ③ ジーラスタ皮下注 3.6m g day3 (治療後 24~72 時間の間であれば OK)

**制吐薬** パロノセトロン注+デキサート注 9.9mg+アロカリス注 235m g

※デカドロン内服はニューモシスチス肺炎増加の報告があるため入れていません

**【処方が必要な内服薬】**

ジーラスタ注 3.6m g は患者負担が約 3 万 5 千円かかることを説明する (疼痛時  
セレコキシブ 100m g など使用)



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+ ) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_