

## S-1(2投1休) 療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&  
部位； ( 胃、結腸、直腸、乳腺、非小肺、胆、膵 )  
ルート； ( 内服 )  
開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
投与間隔； 2週投与1週休薬 で1クール  
体格； 身長\_\_\_\_\_cm 体重\_\_\_\_\_kg 体表面積\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>

使用薬剤；  
エスワнтаイホウ \_\_\_\_\_mg/day 2週間投与 1週休薬


体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

### 【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ ( ) 錠 ×朝夕食後

骨髄抑制、肝障害、消化器症状、下痢に注意



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+),and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_