

## Bev+FOLFOXIRI 療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&

生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

対象： 切除不能進行・再発大腸癌

薬液注入ルート： ポート 末梢点滴静注 CVライン

開始年月日： 年 月 日

投与間隔： 2週を1クール

体格： 身長      cm 体重      kg 体表面積      m<sup>2</sup>

使用薬剤：

- ① ベバシズマブ      mg (5mg/kg) (初回 90 分点滴静注) day1  
(2 回目 60 分、3 回目以降 30 分点滴静注)
- ② イリノテカン      mg (150mg/m<sup>2</sup>) (1 時間点滴静注) day1
- ③ オキサリプラチン      mg (85mg/m<sup>2</sup>) (2 時間点滴静注) day1
- ④ レボホリナート      mg (200mg/m<sup>2</sup>) (2 時間点滴静注) day1,
- ⑤ FU      mg (2400mg/m<sup>2</sup>) (46 時間点滴静注) day1

遺伝子多型；

初回投与前に検査結果確認

※複合ヘテロ及びホモ

では 50%減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

**制吐薬** グラニセトロン注+デキサート注 9.9mg+アロカリス注 235mg

+デカドロン内服 8mg 3日間

**【処方が必要な内服薬】**


デカドロン錠 (4) 2錠 2×朝昼食後 3日分 (翌日開始)

マグミット 330mg 6錠 3×毎食後 /3日間

カルゼオキシコル酸錠 100mg 3錠 3×毎食後 /3日間

重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間 /3日間

オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mgで効果があったという報告があります



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_