

## イリノテカン（3投1休）療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
 部位； ( 乳腺、胃、大腸、小細胞肺癌 )  
 薬液注入ルート； ( 末梢点滴静注、 CVライン ポート )  
 開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 投与間隔； 28日間で1クール  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 使用薬剤；

①イリノテカン \_\_\_\_\_ mg (100 mg/m<sup>2</sup>)  
 3週投与1週休薬

遺伝子多型；

※複合ヘテロ及びホモ  
 では減量を考慮


UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

**制吐剤** グラニセトロン点滴静注用 3mg+デキサート注 3.3mg

### 【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg	1回2錠	1日3回毎食後	/3日間
ウルソ®オキシコール酸錠 100mg	1回1錠	1日3回毎食後	/3日間
重曹錠 500mg	1回1錠	1日3回毎食後2時間	/3日間

38℃以上の発熱時には投与を延期したほうがよい



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_