

## サイラムザ+外来型 FOLFIRI 療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_ 性別： \_\_\_\_\_

対象： 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

薬液注入ルート； ( ポート 末梢点滴静注 CVライン )

開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

投与間隔； 2週を1クール

体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

使用薬剤；①サイラムザ \_\_\_\_\_ mg (8mg/kg) (初回2時間 以後1時間点滴静注) day1

②イリノテカン \_\_\_\_\_ mg (150mg/m<sup>2</sup>) (2時間点滴静注) day1

③レボホリナート \_\_\_\_\_ mg (200mg/m<sup>2</sup>) (2時間点滴静注) day1

④5-FU \_\_\_\_\_ mg (400mg/m<sup>2</sup>) (15分間で静脈内急速投与) day1

⑤5-FU \_\_\_\_\_ mg (2400mg/m<sup>2</sup>) (46時間点滴静注) day1

遺伝子多型；


※複合ヘテロ及びホモ  
では減量を考慮

| UGT1A1 遺伝子多型<br>(○をしてください) |       | *28 |       |         |
|----------------------------|-------|-----|-------|---------|
|                            |       | -/- | -/*28 | *28/*28 |
| *6                         | -/-   | 野生型 | ヘテロ   | ホモ      |
|                            | -/*6  | ヘテロ | 複合ヘテロ |         |
|                            | *6/*6 | ホモ  |       |         |

**制吐薬** グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

**【処方が必要な内服薬】**

レスタミン錠 (10) 5錠 サイラムザ開始 30分前  
 マグミット 330mg 6錠 3×毎食後 /3日間  
 カルデキソール酸錠 100mg 3錠 3×毎食後 /3日間  
 重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間 /3日間



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_