

イリノテカン（3投1休）療法

患者番号： _____ 氏名： _____
 部位； (乳腺、胃、大腸、小細胞肺癌)
 薬液注入ルート；(末梢点滴静注、 CVライン ポート)
 開始年月日； _____年 _____月 _____日
 投与間隔； 28日間で1クール
 体格； 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 使用薬剤；
 ①イリノテカン _____ mg (100 mg/m²)
 3週投与1週休薬

遺伝子多型；

※複合ヘテロ及びホモ
では減量を考慮


UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 3.3 mg

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg 6錠 3×毎食後 /3日間
 ウルソデオキシコール酸錠 100mg 3錠 3×毎食後 /3日間
 重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後 2時間 /3日間

投与目標； (月、年、間)



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)- → HBV-DNA 定量(+)- → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____