

トーリセル療法

患者番号:

氏名:

対象	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌
薬液注入ルート	末梢点滴静注 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
投与間隔	1週間に1回
体格	身長_____cm 体重_____kg 体表面積_____m ²


使用薬剤;

- ① トーリセル _____mg (25 mg/body) 1週間に1回
30~60分間点滴静注

前処置;

- ① レスタミン錠内服(内服不能の場合はポララミン 10mg+生食 20ml)


減量方法;



【処方が必要な内服薬】

レスタミン錠(10) 5錠 トーリセル開始 30分前

- ※ 間質性肺疾患があらわれることがあるため、定期的に胸部CT検査を実施する
- ※ 感染症を起こすことがあるため、投与開始前に肝炎ウイルス、結核など感染の有無を確認する
- ※ infusion reaction、高血糖、創傷治癒遅延、腎不全、電解質異常などに注意する
- ※ 生ワクチンは禁忌
- ※ 無水エタノールを含有するため、アルコール過敏症のある患者に注意する



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____