

ハーセプチン 3週 1回+ハラヴェン療法

患者番号： 氏名： 性別：
生年月日： 年齢：

部位； (乳腺)
薬液注入ルート； (末梢点滴静注、 CVライン ポート)
開始年月日； 年 月 日
体格； 身長 cm 体重 kg 体表面積 m²
投与間隔； 21日間隔で1サイクル
使用薬剤；


- ① ハラヴェン mg (1.4mg/m²) 2週投与 1週休薬
- ② ハーセプチン mg (初回)
 mg (2回目以降)
(初回のみ 8mg/kg 以後 6mg/kg) 3週毎

制吐薬なし

【処方が必要な内服薬】

※初回のみ ボルタレン坐薬 25 mg ハーセプチン開始 30 分前
※2回目以降必要時 カロナール (200) 2錠 発熱時

骨髄抑制、アレルギー、心不全、間質性肺炎 **infusion reaction** に注意
38℃以上の発熱時には投与を延期したほうがよい
EF値 (心エコーを施行する) 50%以上が望ましい
心疾患有り (6~8週毎) 心疾患無し (12週毎)



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)
HBs 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____