光晴会病院化学療法委員会
2018 年 10 月 20 日改訂

ＣＭＦ療法

ＭＴＸ注射＋Ｃ内服＋５－ＦＵ注射

患者番号：　　氏名：　　性別：
生年月日：　　年齢：

部位；　（　乳腺　）
薬液注入ルート；（　末梢点滴静注　　CV ライン　　ポート　　内服　）
開始年月日；　　年　　月　　日
投与間隔；　　28 日間隔で１クール
体格；　身長＿＿＿＿ｃｍ　　体重＿＿＿＿ｋｇ　　体表面積＿＿＿＿m^2

使用薬剤；
①メソトレキセート　＿＿＿＿mg（　40 mg/m^2　）
day1,　8
②エンドキサン錠 50mg　　１回１錠　　１日２回
２週投与２週休薬　　day1～14
③５－ＦＵ　＿＿＿＿mg（　600　mg/m^2　）
day1,　8
制吐薬グラニセトロン内服ゼリー2mg
【処方が必要な内服薬】

グラニセトロン内服ゼリー2mg　開始 30 分前

脱毛、骨髄抑制、消化器症状、心症状に　特に注意



□HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(－) → □HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)
□HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋) → □HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿