

## ドセタキセル療法

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_ 性別： \_\_\_\_\_  
生年月日： \_\_\_\_\_ 年齢： \_\_\_\_\_


部位； ( 乳腺 胃 )  
薬液注入ルート； ( 末梢点滴静注 CVライン ポート )  
開始年月日； \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
投与間隔； 21日間隔で1クール  
体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
使用薬剤；  
① ドセタキセル \_\_\_\_\_ mg ( 60 mg/m<sup>2</sup> ) day 1  
3週毎

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

### 【処方が必要な内服薬】

骨髄抑制、アレルギー、関節痛、筋肉痛に注意

投与目標； ( \_\_\_\_\_ 月、 \_\_\_\_\_ 年、間 )



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_