

M-VEC 療法

患者番号：

氏名：

性別：

生年月日：

年齢：

対象 進行性尿路上皮癌

薬液注入ルート 末梢点滴静注、CV ライン ポート

開始年月日 年 月 日

1 コース期間 28 日間

体格 身長 cm 体重 kg 体表面積 m²減量・中止基準 白血球数が 2,000/mm³未満又は好中球数が 1,000/mm³未満

	抗がん剤名	投与量	投与開始日程			
			1日目	2日目	15日目	22日目
1	メソトレキセート	mg (30mg/m ²)	●		●	●
2	エクザール	mg (3mg/m ²)		●	●	●
3	エピルビシン	mg (30mg/m ²)		●		
4	ランダ	mg (70mg/m ²)		●		

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 9.9mg


イメンド内服 (3日間) +デカドロン内服 8mg 3日間

【処方が必要な内服薬】

イメンド (125) 1C グラニセトロン開始 30 分前

イメンド (80) 1C1×朝食後 2 日分 (翌日開始)

デカドロン錠 (4) 2錠 2× 3 日分 (翌日開始)



□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

□HBV-DNA 定量(+) → 3ヶ月毎 定量

□HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____