

スチバーガ療法

患者番号： _____ 氏名： _____
部位； （ 結腸 直腸 ）
対象； PS0～1 3次治療以降
薬液投与経路； （ 内服 ）
開始年月日； _____年 _____月 _____日
投与間隔； 28日間隔で1サイクル
体格； 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
使用薬剤；

① スチバーガ錠 40mg 1回4錠 1日1回朝食後 高脂肪食を避けて
3週間投与1週間休薬

減量方法；

初回	1段階	2段階	
160mg	→ 120mg	→ 80mg	(下限)

【処方が必要な内服薬】


ピドキサール (10) 6錠 3×毎食後 (1週間前から使用)
パスタロンクリーム 10% 1日5回以上塗布 (1週間前から使用)

投与が決まったら角質除去、保湿対策などを開始する

重大な副作用；手足症候群、皮膚障害、肝機能障害、出血、血栓塞栓症、
高血圧、可逆性後白質脳症、消化管穿孔

※ 手術前2週間休薬

※ 肝機能検査を最初2サイクルは週1回、投与開始6ヶ月までは2週に1回行う



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____