

Low dose FP 動注療法  
(5-FU+少量シスプラチン) 動注

患者番号： \_\_\_\_\_ 氏名： \_\_\_\_\_  
 部位； ( 肝 )  
 薬液注入ルート；( 動注ポート )  
 開始年月日； \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日  
 投与間隔； 5-FU \_\_\_\_\_ 連続5日間投与 2日間休薬  
                ランダ \_\_\_\_\_ 連続5日間投与 2日間休薬  
 体格； 身長 \_\_\_\_\_ cm      体重 \_\_\_\_\_ kg      体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

使用薬剤；(1サイクル)


①ランダ \_\_\_\_\_ mg (7mg/m<sup>2</sup>) (day 1～5 )  
0.5時間投与

②5-FU \_\_\_\_\_ mg (170mg /m<sup>2</sup>) (day 1～5 )  
3時間投与

制限 5-FU 250~375mg/body まで

制吐剤 グラニセトロン 静注用 3mg

【処方が必要な内服薬】



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-) →  HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+) →  HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_