

Bev+S-1 療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

対象：転移性結腸・直腸癌で、PS：0～2

薬液注入ルート；（ポート 末梢点滴静注 CVライン 内服）

開始年月日； 年 月 日

投与間隔； 6週1クール

体格； 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²

使用薬剤；

注射 ①ベバシズマブ _____ mg (5mg/kg) 2週に1回

内服 ①エスワнтаイホウ 1回 _____ mg 1日2回 4週投与2週休薬


体表面積	初回基準量（テガフル相当量）
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

制吐薬なし

【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ () 錠 ×朝夕食後



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____