

Bev+SOX療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

対象：転移性結腸・直腸癌で、PS：0～1、脳転移がない症例

薬液注入ルート；（ポート 末梢点滴静注 CVライン 内服）

開始年月日； 年 月 日

投与間隔； 3週を1クール

体格； 身長 cm 体重 kg 体表面積 m²

使用薬剤；

注射 ①ベバシズマブ mg (7.5mg/kg) 3週に1回

②オキサリプラチン mg (130mg/m²) 3週に1回

内服 ①エスワнтаイホウ 1回 mg 1日2回 2週投与1週休薬

体表面積	初回基準量（テガフル相当量）
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60 mg/回


オキサリプラチンは6コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注16.5mg、ファモチジン注20mg、レスタミン錠50mgで効果があったという報告があります

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ OD（ ） 錠 2×朝夕食後



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____