

Bev+mFOLFOX 6 療法

(ベバシズマブ+オキサリプラチン+レボホリナート+FU) トレフューザー

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&

生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

対象：転移性結腸・直腸癌で、PS：0～2、5-FU もしくはオキサリプラチンの前治療がない症例

薬液注入ルート；(ポート 末梢点滴静注 CVライン)

開始年月日； _____年 _____月 _____日

投与間隔； 2週を1クール

体格； 身長_____cm 体重_____kg 体表面積_____m²


使用薬剤；

- ① ベバシズマブ _____mg (5mg/kg) (初回 90 分点滴静注) day1
(2回目 60 分、3回目以降 30 分点滴静注)
- ② オキサリプラチン _____mg (85mg/m²) (2 時間点滴静注) day1
- ③ レボホリナート _____mg (200mg/m²) (2 時間点滴静注) day1
- ④ FU _____mg (400mg/m²) (15 分間で静脈内急速投与) day1
- ⑤ FU _____mg (2400mg/m²) (46 時間点滴静注) day1

制吐薬 グラニセトロン注+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

オキサリプラチンは6コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mgで効果があったという報告があります



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____