

タイケルブ＋カペシタビン療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

部位； (乳腺)

内服

開始年月日； _____年 _____月 _____日

投与間隔；タイケルブ 連日投与

カペシタビン 2週投与 1週休薬 で1クール

体格； 身長_____c m 体重_____k g 体表面積_____m²

使用薬剤；

① タイケルブ (250mg)： 1250 mg (5 T) 1日1回 連日投与
食事の前後1時間以内を避ける

② カペシタビン (300mg)： _____ mg (1回用量 1000 mg/m²)
1日2回、2週投与 1週休薬

【処方が必要な内服薬】

タイケルブ (250) 5錠 1×食事の前後1時間を避ける

カペシタビン (300) 錠 ×朝夕食後

ピドキサール (10) 6錠 3×毎食後

パスタロンクリーム 10% 1日5回以上塗布

手足症候群、骨髄抑制、消化器症状、下痢、口内炎、全身疲労感に注意



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____