

カバジタキセル療法

(ジェブタナ)

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

対象	ドセタキセル抵抗性前立腺癌
薬液注入ルート	末梢点滴静注 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
投与間隔	21日間隔で1クール
体格	身長__cm 体重__kg 体表面積__m ²

使用薬剤； ※アルコール含有

① ジェブタナ__mg (25 mg/m²) day 1
(25mg未満の時は溶解液を100mLにする) 3週に1回

② プレドニン10mg/日 (用法は問わない)

day1より連日投与


FNのリスク因子を有する患者はジーラスタの予防投与を推奨 (3日目に外来で投与)

(リスク因子：65歳以上 PS不良 既往歴あり 広範囲放射線照射等の強い前治療歴 腫瘍の骨浸潤 等)

制吐薬 グラニセトロンゼリー2mg+デキサート注6.6mg

【処方が必要な内服薬】

グラニセトロンゼリー2mg 1包1× ジェブタナの30分前
レスタミン錠 (10) 5錠1× ジェブタナの30分前
プレドニン (5) 2錠 / 毎日



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) → HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____