

## C-SOX 療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName& 性別：&tagPatSex&

生年月日：&tagPatBirth& 年齢：&tagPatage&

対象： stageⅢ結腸癌術後補助療法

薬液注入ルート：末梢点滴静注、CVライン ポート

開始年月日： 年 月 日

1コース期間： 3週間

目標コース数： 8コース

体格： 身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup>

開始基準： 好中球数 $\geq$ 1300/mm<sup>3</sup> 血小板数 $\geq$ 75000/mm<sup>3</sup>

AST/ALT $\leq$ 100IU/L Cr $<$ 1.5mg/dL

使用薬剤：

注射 ①オキサリプラチン \_\_\_\_\_mg (130mg/m<sup>2</sup>) 3週に1回

内服 ①エスワнтаイホウ 1回 \_\_\_\_\_mg 1日2回 2週投与1週休薬

体表面積	初回基準量 (テガフル相当量)
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上～1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60 mg/回


オキサリプラチンは6コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります

※腎機能を考慮した上で初回基準量を調節

制吐剤 グラニセトロン静注用 3mg+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】

エスワнтаイホウ ( ) 朝夕食後



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBe 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBe 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

医師サイン \_\_\_\_\_