

## CP療法

### シスプラチン+イリノテカン

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

部位； (胃)

薬液注入ルート；(末梢点滴静注、CVライン ポート)

開始年月日； 年 月 日

投与間隔； 14日間で1クール

体格； 身長          cm 体重          kg 体表面積          m<sup>2</sup>

使用薬剤；①イリノテカン          mg ( 60 mg/m<sup>2</sup> ) day 1, 15

②シスプラチン          mg ( 30 mg/m<sup>2</sup> ) day 1, 15

遺伝子多型；


※複合ヘテロ及びホモ  
では減量を考慮

UGT1A1 遺伝子多型 (○をしてください)		*28		
		-/-	-/*28	*28/*28
*6	-/-	野生型	ヘテロ	ホモ
	-/*6	ヘテロ	複合ヘテロ	
	*6/*6	ホモ		

**制吐剤** グラニセトロン静注用 3mg+デキサート注 9.9mg

**【処方が必要な内服薬】**

ウルソデオキシコール酸 3錠 3× 3日分  
マグミット (330) 6錠 3×毎食後 3日分  
重曹錠 500mg 3錠 3×毎食後2時間 3日分



HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

HBs 抗原(-) →  HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量

HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン \_\_\_\_\_