

CBDCA+PTX 療法(パクリタキセル+カルボプラチン)

患者番号: &tagPatNo& 氏名: &tagPatName& 性別: &tagPatSex&
生年月日: &tagPatBirth& 年齢: &tagPatage&

がん種	非小細胞肺癌
適応患者	StageⅢB~Ⅳ期の非小細胞肺癌患者 術後病期ⅠB, Ⅱ, ⅢA期非小細胞肺癌・完全切除症例
薬液注入ルート	末梢点滴静注、CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
1コース期間	3週間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²
減量・中止基準	白血球数が4,000/mm ³ 未満又は好中球数が2,000/mm ³ 未満

	抗がん剤名	投与量	投与日程
1	パクリタキセル※	mg (200mg/m ²)	1週投与2週休薬 Day1
2	カルボプラチン	mg (AUC5)	1週投与2週休薬 Day1


※アルコール含有

制吐剤 パロノセトロン注 0.75mg+デキサート注 16.5mg+ファモチジン注 20mg
+アロカリス注 235mg +経口デカドロン 8mg(Day2-3)

【処方が必要な内服薬】

パクリタキセルアレルギー予防のデキサメタゾン
は、症状がなければ半量ずつ減量が可能です。
(最低量 1.65 mg 1A)

デカドロン 4mg 2錠 2×朝昼食後/2日分 (翌日開始)
レスタミン錠 (10) 5錠 1× パクリタキセル開始 30分前



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____