

カルボプラチン+エトポシド(ベプシド)療法

患者番号：&tagPatNo& 氏名：&tagPatName&

対象	成人肺小細胞癌
薬液注入ルート	末梢点滴静注、 CVライン ポート
開始年月日	年 月 日
1コース期間	3～4週間
体格	身長 cm 体重 kg 体表面積 m ²

	抗がん剤名	投与量	投与開始日程		
			1日目	2日目	3日目
1	カルボプラチン	mg (AUC 5)	●		
2	ベプシド※	mg (80mg/m ²)	●	●	●

※アルコール含有

ベプシド<肝障害時>


T-Bil 1.5～3.0mg/dl or AST 60～180IU/L	50%減量
T-Bil >3.0mg/dl or AST >180IU/L	投与中止

<腎障害時>

CCr 50ml/min 未満で減量を考慮する

制吐剤 パロノセトロン注 0.75mg+デキサート注 6.6mg

【処方が必要な内服薬】



- HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
- HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
- HBs 抗体(+)-and/or HBc 抗体(+)
- HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____