

→今月の【 掲示板 】 2021/6月～7月

今月の待合室は、薬剤科より『糖尿病治療薬について』を掲示しています。

糖尿病のお薬について
 血糖を下げる薬は3つに分けられます
 ①飲み薬
 ②インスリン注射薬
 ③GLP-1製剤
 (薬剤: ラーエルビーワン)

※飲み薬では、インスリンを出すように働く薬(GLI阻とグリコ阻薬)を使用中の方は、特に低血糖への注意が必要です。
 ※インスリン注射を使用中の方も低血糖への注意が必要です。
 ※飲み薬と注射薬を使用している方や、飲み薬と注射薬を組み合わせて使用中の方も低血糖への注意が必要です。

今月の担当は 薬剤科 です

特に低血糖に注意 <インスリン注射薬>

<2型糖尿病の飲み薬>

①血糖を下げる働きを速くする薬 ②血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ③血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ④血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ⑤血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ⑥血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ⑦血糖を下げる働きをゆるやかにする薬 ⑧血糖を下げる働きをゆるやかにする薬	
---	--

**<GLP-1受容体作動薬>
(ジーエルビーワン)**
 2型糖尿病に使用する薬です。注射薬ですがインスリン注射ではありません。体内でGLP-1と同様の働きをし、血糖を下げます。

薬の名前	薬の性状	作用時間	服用回数
ビロートゾル		24時間	1日1回注射
トリスリンビーワン		長期持続	週に1回注射
オゼンピック		長期持続	週に1回注射

●空腹時血糖値と食後血糖値の両方を下げ体重を増やさずに血糖を改善します。
 ●食欲が増える、肝機能改善、腎臓保護の効果があります。
 ●下痢、便秘、吐き気などの内臓障害が使用開始時に起こりやすい。また急性膵炎が起きることが少ないが報告されています。
 ●低血糖が起こりにくいお薬です。

低血糖時の対応

- ①ブドウ糖10gを摂取する
- ②ブドウ糖が手元にない場合は、砂糖入りの飲み物(ジュース、お茶、スポーツドリンク)を飲む

ブドウ糖を含む飲料

補食に適した炭水化物

これらの薬を飲んでいる方への注意

●次の食事まで1時間は追加の炭水化物(10g程度)を摂取する