

Bev+ロンサーフ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	28 日間
体格	身長 &tagPatHeight& cm	体重 &tagPatWeight& kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	注射：最小度 経口：中等度	制吐剤	なし
特記事項 (ベバシズマブ)	※【投与時間】 初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ベバシズマブ	mg (5mg/kg)	※	Day1,15
ロンサーフ	mg / 回 1 日 2 回朝夕食後	経口	下記参照

ロンサーフ投与スケジュール				
5 日間 服薬	2 日間 休薬	5 日間 服薬	2 日間 休薬	14 日間 休薬

体表面積 (m ²)	初回基準量	1 回服用錠数		体表面積 (m ²)	初回基準量	1 回服用錠数	
		15mg	20mg			15mg	20mg
1.07 未満	35mg/回	1 錠	1 錠	1.69～1.84	60mg/回	—	3 錠
1.07～1.23	40mg/回	—	2 錠	1.84～1.99	65mg/回	3 錠	1 錠
1.23～1.38	45mg/回	3 錠	—	1.99～2.15	70mg/回	2 錠	2 錠
1.38～1.53	50mg/回	2 錠	1 錠	2.15 以上	75mg/回	1 錠	3 錠
1.53～1.69	55mg/回	1 錠	2 錠				

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン _____