

Bev+FOLFIRI療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

|                  |                                                                      |                         |                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| がん種 (適応)         | 大腸癌                                                                  |                         |                           |
| 開始年月日            | 年 月 日                                                                | 1 コース期間                 | 14 日間                     |
| 体格               | 身長<br>&tagPatHeight& cm                                              | 体重<br>&tagPatWeight& kg | 体表面積 m <sup>2</sup>       |
| 嘔気・嘔吐リスク         | 中等度                                                                  | 制吐剤                     | パロノセトロン注<br>+デキサート注 6.6mg |
| 特記事項<br>(ベバシズマブ) | ※【投与時間】<br>初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目 30 分への短縮可                  |                         |                           |
| 特記事項<br>(イリノテカン) | ・ 遺伝子多型 (複合ヘテロ及びホモ) では減量を考慮<br>複合ヘテロ: (*6/*28) ホモ: (*6/*6) (*28/*28) |                         |                           |

| 投与薬剤        | 投与量                         | 投与時間  | 投与スケジュール |
|-------------|-----------------------------|-------|----------|
| ベバシズマブ      | mg (5mg/kg)                 | ※     | Day1     |
| イリノテカン      | mg (150mg/m <sup>2</sup> )  | 2 時間  | Day1     |
| レボホリナート     | mg (200mg/m <sup>2</sup> )  | 2 時間  | Day1     |
| 5-FU (急速静注) | mg (400mg/m <sup>2</sup> )  | 15 分  | Day1     |
| 5-FU (持続静注) | mg (2400mg/m <sup>2</sup> ) | 46 時間 | Day1     |

【処方が必要な内服薬】

マグミット 330mg 1 回 2 錠 1 日 3 回毎食後/3 日間  
ウルソデ オキシコール酸錠 100mg 1 回 1 錠 1 日 3 回毎食後/3 日間  
炭酸水素ナトリウム錠 500mg 1 回 1 錠 1 日 3 回毎食後 2 時間/3 日間

□HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介  
□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量  
□HBs 抗体(+ )and/or HBc 抗体(+ ) → □HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン